

## 48.1 Ord. RHODODENDRO FERRUGINEI-VACCINIETALIA MICROPHYLLI Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

### **Sinonimi**

[*Loiseleurio-Vaccinieta* Egger 1952 nom. nud. (art. 2b, 8), *Empetretalia hermaphroditii* Schubert 1960 (syntax. syn.), *Rhododendro hirsuti-Ericetalia carneae* Grabherr, Greimler & Mucina in Grabherr & Mucina 1993, corresp.: *Rhododendro-Vaccinieta* Rameau 1996 nom. nud. (art. 2b, 8) [*Rhododendro-Vaccinieta* Rameau in Rameau, Mansion & Dumé 1993 nom. inval. (art. 2b, 2d, 3b, 8)], *Juniperenalia nanae* Rameau 1996 nom. nud. (art. 2b, 8) [*Juniperenalia nanae* Rameau in Rameau, Mansion & Dumé 1993 prov. nom. inval. (art. 2b, 2d, 3b, 8)]]

### **Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)**

### **Definizione e descrizione (declaratoria)**

Vegetazione climatofila delle lande artico-alpine e subartico-subalpine, che si sviluppa su suoli crioturbati, eventualmente associata alla dinamica delle foreste di conifere.

### **Definizione e descrizione inglese**

Climatophilous dwarf-shrub vegetation of the arctic-alpine and subarctic-subalpine heath that grow on cryoturbate soils. These communities constitute a mature stage or are dynamically linked to coniferous forests.