

57 CI AGROSTIETEA STOLONIFERAЕ Oberdorfer 1983

Sinonimi

[*Agrostietea stoloniferae* Oberdorfer in Oberdorfer, Görs, Korneck, Lohmeyer, Müller, Philippi & Seibert 1967 *pro syn. nom. inval.* (art. 2b, 2d, 3a, 8), *Agrostietea stoloniferae* Müller & Görs in Görs 1969 *nom. inval.* (art. 2b, 8), *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937 (art. 35) *p.p.* ('*Molinieto-Arrhenatheretales*' art. 41b) (syntax. syn.), *Plantaginetea majoris* Tüxen & Preising ex Von Rochow 1951 ('...*majoris*' art. 41a) [*Plantaginetea majoris* Tüxen & Preising in Tüxen 1950 *nom. nud.* (art. 2b, 8) ('...*majoris*' art. 41a) *p.p.*], *Agrostio stoloniferae-Arrhenatheretea elatioris* de Foucault 1984 *nom. inval.* (art. 2d, 3o, 5) *p.p.*]

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)

Definizione e descrizione (declaratoria)

Praterie da mesotrofiche a eutrofiche, più o meno lungamente sottoposte ad inondazioni, legate agli ambienti fluviali o alle pianure marine.

Definizione e descrizione inglese

Mesotrophic to eutrophic meadow vegetation that grows in areas that are flooded for long periods and is found in riverine habitats or maritime plains.