

## 71.1.9 All. Galio rotundifolii-Abietion albae (Oberdorfer 1962) Rivas-Martínez 1987

### Sinonimi

-----

### Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)

*Pyrolo-Abietetum* (Oberdorfer 1957) Rivas-Martinez 1987

### Definizione e descrizione (declaratoria)

Boschi di *Abies alba* ad influenza atlantico-centro-europea.

### Definizione e descrizione inglese

*Abies alba* forests with central-European and Atlantic influences.

### Ecologia

Boschi di abete che si instaurano a quote superiori a quelle della faggeta.

### Distribuzione

Le abetine sono prevalentemente distribuite al Nord Italia, ma ci sono esempi anche per l'Italia appenninica per lo più a carattere relittuale su versanti ripidi. Quelle appenniniche infatti sono quasi tutte di origine selvicolturale e in alcuni casi è difficile stabilire quali di esse siano derivate da ampliamenti di siti naturali. In Europa sono presenti in abetine in centroeuropea e nei Pirenei.

### Struttura della vegetazione e composizione floristica

Le foreste di abete sono particolarmente ricche di specie, trattandosi di cenosi di transizione tra le peccete e le faggete.

specie abbondanti e frequenti: *Abies alba*, *Picea abies*, *Sorbus aucuparia*, *Larix decidua*, *Gooderya repens*, *Lonicera alpigena*, *Lonicera nigra*, *Calamagrostis villosa*, *Melampyrum sylvaticum*,

specie diagnostiche: *Hieracium vulgatum*, *Gooderya repens*, *Melampyrum sylvaticum*, *Listera cordata*, *Lycopodium annotinum*, *Orthilia secunda*, *Huperzia selago*, *Lonicera alpigena*, *Lonicera nigra*, *Plagiothecium undulatum*, *Pleurozium schreberi*, *Rhytidiadelphus loreus*, *Galium rotundifolium*, *Veronica urticifolia*,

### Contesto paesaggistico e sinsistema di riferimento

## Habitat di riferimento (sensu Direttiva Habitat e classificazione EUNIS)

### Livello di conservazione e gestione

Il livello di conservazione non è definibile con le informazioni attualmente a disposizione.

In termini gestionali si ritiene opportuno conservare tali comunità e aumentare le indagini sulla loro composizione, struttura, distribuzione e dinamica.

### Presenza nei parchi nazionali

Gran Paradiso

Val Grande

Stelvio - Stilfserjoch

Dolomiti Bellunesi

Cinque Terre

Appennino Tosco-Emiliano

Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Arcipelago Toscano

Monti Sibillini

Gran Sasso e Monti della Laga

Majella

Abruzzo, Lazio e Molise

Circeo

Gargano

Vesuvio

Alta Murgia

Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese

Pollino

Sila

Aspromonte

Gennargentu

Asinara

Arcipelago di La Maddalena

### Bibliografia

Kucera P. 2008. Remarks on higher-ranked *syntaxa* with *Abiesalba* in Central Europe: their concepts and nomenclature. *Hacquetia* 7 (2): 161–172.

Kucera P. 2009. Some remarks on Slovak *syntaxa* of Galio-Abietenion and Vaccinio-Abietenion. *Acta Bot. Univ. Comen.* 44: 21-32.

Kucera P. & Kliment J. (2011): On the nomenclature and syntaxonomy of the phytosociological survey "Die Wälder und Gebüsche Österreichs": examples of the class *Piceeteaexce/saeKlika* 1948. *Thaiszia J. Bot.* 21: 85-92.

- Oberdorfer E. 1957. Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Gustav Fischer, Jena. 564 pp.
- Oberdorfer E. 1962. Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Süddeutschland und die angrenzenden Gebiete. Systematische Übersicht der süddeutschen Vegetations-einheiten (Assoziationen und höhere Einheiten). Eugen Ulmer, Stuttgart. pp. 19–42.
- Rivas-Martínez S. 1987. Memoria del mapa de Series de Vegetación de España 1:400.000. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ICONA, Madrid.
- Ubaldi D. 2003. La vegetazione boschiva d'Italia. Manuale di fitosociologia forestale. CLUEB.