

## 71.1 Ord. FAGETALIA SYLVATICAE Pawowski in Pawowski, Sokoowski & Wallisch 1928

### **Sinonimi**

[*Carpino-Fagetalia* Scamoni & Passarge 1959 (syntax. syn.), *Luzulo-Fagetalia* Scamoni & Passarge 1959 (syntax. syn.), *Aremonio-Fagetalia* 1970 *nom. inval.* (art. 3b), *Tilietalia platyphylli* Moor 1973 (syntax. syn.), *Lathyro veneti-Carpinetalia betuli* Ubaldi 1995 (syntax. syn.) *p.p.*, *Carpino-Fagenalia* Rameau (1981) 1996 *nom. inval.* (art. 2b, 2d, 3o, 5, 8)]

### **Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)**

### **Definizione e descrizione (declaratoria)**

Vegetazione forestale costituita da caducifoglie mesofile, presente tipicamente nelle aree a termotipo supratemperato e, limitatamente a stazioni molto fresche con suolo profondo e umido, anche in quelle a termotipo mesotemperato. Vegetazione con areale di distribuzione centro-europeo-caucasico.

### **Definizione e descrizione inglese**

Mesophilous deciduous forests that typically grow in the supratemperate thermotype, as well as in cool sites where the soil is deep and moist in the mesotemperate thermotype. This vegetation type is distributed in the central European-Caucasian area.