

## 71.2 Ord. QUERCETALIA ROBORIS Tüxen 1931

### **Sinonimi**

[*Quercetalia robori-sessiliflorae* Tüxen 1937 (art. 29), *Quercetalia robori-sessiliflorae* Br.-Bl. & Tüxen 1943 *nom. nud.* (art. 2b, 8) ('...*roboris-sessilifloræ*' art. 41b), *Quercetalia robori-sessiliflorae* (Tüxen 1931) Br.-Bl. 1950 *nom. nud.* (art. 2b, 8, 29)]

### **Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)**

### **Definizione e descrizione (declaratoria)**

Vegetazione forestale costituita da latifoglie decidue e acidofile, che si sviluppa su suoli oligotrofici, fisionomicamente dominata da *Castanea sativa*, *Quercus petraea*, *Fagus sylvatica* e *Betula pendula*. Presente nelle regioni a clima atlantico, subatlantico e subcontinentale dell'Europa. In Italia è presente sulle Alpi centro-occidentali e nell'Alta Pianura Padana occidentale, su substrati a reazione acida.

### **Definizione e descrizione inglese**

Acidophilous, broadleaf, deciduous forests found on oligotrophic soils, that are dominated by *Castanea sativa*, *Quercus petraea*, *Fagus sylvatica* and *Betula pendula*, and grow in European regions with an Atlantic, sub- Atlantic or subcontinental climate. In Italy, they are found in the western-central Alps and in the upper western Po plain, on acidic substrates.