

## 15.1 Ord. MONTIO FONTANAE-CARDAMINETALIA AMARAE Pawłowski in Pawłowski, Sokolowski & Wallisch 1928

### **Sinonimi**

*Cardamino amarae-Caricetalia remotae* Kästner 1941 *pro syn. nom. inval.* (art. 2d, 3a) p.p.,  
*Cardamino-Cratoneuretalia* Maas 1959 (syntax. syn.), *Cratoneuro-Philonotidetalia* Geissler 1976  
prov. nom. inval. (art. 2d, 3b), *Cardamino amarae-Chrysosplenietalia alternifolii* Hinterlang 1992  
(syntax. syn.) p.p.

### **Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)**

### **Definizione e descrizione (declaratoria)**

Vegetazione che si rinviene nel macrobioclina temperato, principalmente nelle aree montane e alto-montane, e che si sviluppa in presenza di acque fredde su substrati essenzialmente silicicoli (non torbosi) o poveri di calcio.

### **Definizione e descrizione inglese**

Vegetation that occurs from the supra- to orotemperate bioclimatic belts, with extensions into the mesotemperate belt, and grows on mainly silicicolous (no-peaty) or calcium-poor substrata when cold waters are present.