

18 CI SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA NIGRAE *nom. mut. propos. ex Steiner 1992*

Sinonimi

[*Scheuchzerio-Caricetales fuscae* Tüxen 1937 (original name), *Parvocaricetea* Westhoff in Westhoff & Den Held 1969 (syntax. syn.), *Scheuchzerietea palustris* Den Held, Barkman & Westhoff in Westhoff & Den Held 1969 (syntax. syn.), *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* Tüxen 1937 (art. 45)]

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)

Definizione e descrizione (declaratoria)

Vegetazione igrofila delle torbiere a prevalenza di ciperacee, con eventuale presenza di sfagni e di altre briofite che si rinviene dalle aree di pianura (relitti glaciali) a quelle a termotipo criorotemperato, su suolo torboso, paratorboso o minerale, da oligotrofico a mesotrofico, da neutro-alcalino a moderatamente acido, non soggetto a periodi di prosciugamento.

Definizione e descrizione inglese

Hygrophilous fen vegetation dominated by sedges, with the possible presence of various mosses including Sphagnum, that grows from the lowland (glacial relicts) to the cryorotemperate thermotype belts, on peaty, para-peaty and mineral soils characterized by oligotrophic to mesotrophic nutrient conditions, neutral- alkaline to moderately acid acidity, and no dry-periods.