

26 CI SARCOCORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. & Tüxen ex A. Bolòs & O. Bolòs in A. Bolòs 1950 em. Biondi, Casavecchia, Estrelles & Soriano, 2013

Sinonimi

[*Salicornietea fruticosae* Br.-Bl. and Tüxen, 1943 (art. 8), *Salicornietea fruticosae* Br.-Bl. and Tüxen ex A. and O. Bolòs, 1950 (art. 45), *Arthrocnemetea* Br.-Bl. and Tüxen, 1943 *corr.* Bolòs, 1957, *Salicornietea fruticosae* Br.-Bl. ex Tüxen and Oberdorfer, 1958 (art. 8), *Sarcocornietea fruticosae* Braun-Blanq. and Tüxen ex A. Bolòs and O. Bolòs in A. Bolòs, 1950 *nom. mut. propos.* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernandez-González, Izco, Loidi, Lousã and Penas, 2002]

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)

Definizione e descrizione (declaratoria)

Vegetazione pioniera, perenne, iper-alofila, succulente, legnosa e semi-legnosa, diffusa principalmente nei bacini salati delle coste mediterranee e termo-atlantiche, presente anche nella Penisola del Sinai.

Definizione e descrizione inglese

Pioneer, perennial, hyperhalophilous, succulent, woody and semi-woody vegetation mainly spread in the salt basins of the Mediterranean and thermo-Atlantic coasts also represented into the Sinai Peninsula.