

## 30.3a Sub-Ord. ASPLENIENALIA LANCEOLATO-OBOVATI Loisel 1970

### **Sinonimi**

[*Asplenienalia lanceolato-obovati* Loisel 1970 ('*Asplenietalia ...*' pro subord. art. 41b) (nom. correct.), *Asplenietalia billotii-obovati* Loisel 1970 *nom. mut. illeg.*]

### **Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)**

### **Definizione e descrizione (declaratoria)**

Comunità casmofitiche ad ampia distribuzione, che si sviluppano nelle aree da collinari a montane.

### **Definizione e descrizione inglese**

Chasmophytic communities that grow in the hilly and mountain belts in the Temperate macrobioclimate, as well as in the Mediterranean macrobioclimate in the supra-Mediterranean thermotype.

### **Ecologia**

### **Distribuzione**

### **Struttura della vegetazione e composizione floristica**

specie abbondanti e frequenti:

specie diagnostiche:

### **Contesto paesaggistico e sinsistema di riferimento**

### **Habitat di riferimento (sensu Direttiva Habitat e classificazione EUNIS)**

### **Livello di conservazione e gestione**

Per queste informazioni si rimanda all'alleanza di riferimento

### **Presenza nei parchi nazionali**

Gran Paradiso

Val Grande

Stelvio - Stilfserjoch

Dolomiti Bellunesi  
Cinque Terre  
Appennino Tosco-Emiliano  
Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna  
Arcipelago Toscano  
Monti Sibillini  
Gran Sasso e Monti della Laga  
Majella  
Abruzzo, Lazio e Molise  
Circeo  
Gargano  
Vesuvio  
Alta Murgia  
Cilento, Vallo di Diano e Alburni  
Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese  
Pollino  
Sila  
Aspromonte  
Gennargentu  
Asinara  
Arcipelago di La Maddalena

## **Bibliografia**