

37.1.2 All. Salsolo oppositifoliae-Suaedion mollis Rigual 1972

Sinonimi

[*Salsolo-Suaedion* Rigual 1972 (nom. correct.), *Suaedenion fruticoso-verae* Peinado, Martínez Parrasa & Bartolomé 1986 (syntax. syn.)]

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)

Definizione e descrizione (declaratoria)

Comunità nitrofile localizzate su suoli argillosi idromorfi, che sopportano una certa salinità temporanea, nel piano bioclimatico infra- e termomediterraneo arido-semiarido.

Definizione e descrizione inglese

Nitrophilous communities on clayey hydromorphic soils that tolerate a certain degree of temporary salinity and grow in infra- and thermo-Mediterranean arid-semi-arid bioclimates.

Ecologia

Distribuzione

Struttura della vegetazione e composizione floristica

specie abbondanti e frequenti:

specie diagnostiche:

Contesto paesaggistico e sinsistema di riferimento

Habitat di riferimento (sensu Direttiva Habitat e classificazione EUNIS)

Livello di conservazione e gestione

Per queste informazioni si rimanda all'alleanza di riferimento

Presenza nei parchi nazionali

Gran Paradiso

Val Grande

Stelvio - Stilfserjoch

Dolomiti Bellunesi

Cinque Terre

Appennino Tosco-Emiliano
Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna
Arcipelago Toscano
Monti Sibillini
Gran Sasso e Monti della Laga
Majella
Abruzzo, Lazio e Molise
Circeo
Gargano
Vesuvio
Alta Murgia
Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese
Pollino
Sila
Aspromonte
Gennargentu
Asinara
Arcipelago di La Maddalena

Bibliografia