

51.2 Ord. BROMETALIA ERECTI Koch 1926

Sinonimi

[*Brometalia* Br.-Bl. 1931 (art. 8), *Koelerio-Phleetalia phleoidis* Korneck 1974 (syntax. syn.), *Brometalia erecti* Br.-Bl. 1936 *nom. amb. propos. p.p.* (typo excl.; art. 31), Xero-Brometalia Doing 1963 *p.p.* (art. 8), *Brometalia erecti* Br.-Bl. 1936 *nom. amb. propos.* sensu Korneck 1974 (typo excl.), *Xero-Brometalia erecti* Royer ex Dengler 1994 (art. 8, 12(2)), *Artemisio albae-Brometalia erecti* Ubaldi ex Dengler & Mucina in Mucina, Dengler, Bergmeier, arni, Dimopoulos, Jahn & Matevski 2009 (art. 22)]

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)

Definizione e descrizione (declaratoria)

Praterie secondarie, meso-xerofile, calcicole, subatlantiche e submediterranee, dell'Europa centro-occidentale.

Definizione e descrizione inglese

Meso-xerophilous, calcicolous, sub-Atlantic and sub-Mediterranean, secondary grasslands of central-western Europe.