

51.3 Ord. PHLEO AMBIGUI-BROMETALIA ERECTI Biondi, Allegrezza, Blasi & Galdenzi in Biondi, Allegrezza, Casavecchia, Galdenzi, Gasparri, Pesaresi, Vagge & Blasi 2014

Sinonimi

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)

Definizione e descrizione (declaratoria)

Praterie secondarie, xerofile e semi-mesofile, presenti nelle regioni bioclimatiche Mediterranea e Temperata (spesso anche nella variante sub-mediterranea), nei piani bioclimatici a termotipo supramediterraneo o a termotipo da supratemperato superiore a mesotemperato (con *optimum* nel mesotemperato). Questo ordine vicaria, nell'Appennino centro-meridionale (ad esclusione delle Calabria) l'ordine *Scorzonero-Chrysopogonetalia* che è prettamente illirico.

Definizione e descrizione inglese

Xerophilous and semi-mesophilous secondary grasslands, that occur in the Mediterranean and Temperate bioclimatic regions (often even in the sub-Mediterranean variant), in the supra-Mediterranean and in the upper supratemperate to the mesotemperate thermotypes (with *optimum* in the mesotemperate). In the central-southern Apennines this order it is the vicariant of the purely Illyrian order *Scorzonero-Chrysopogonetalia* (with the exception of Calabria).