

56 CI MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937

Sinonimi

[*Molinieto-Arrhenatheretales* Tüxen 1937 (original name), *Molinio-Juncetea* Br.-Bl in Br.-Bl., Emberger & Molinier 1947 (art. 8), *Arrhenatheretea* Br.-Bl in Br.-Bl., Emberger & Molinier 1947 (art. 8), *Plantaginetea majoris* Tüxen & Preising ex Von Rochow 1951 (syntax. syn.), *Molinio-Juncetea* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950 (syntax. syn.), *Agrostio stoloniferae-Arrhenatheretea* de Foucault 1989 (art. 29)]

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)

Definizione e descrizione (declaratoria)

Praterie mesofile, meso-igrofile o igrofile, presenti dalla costa al piano montano e alto-montano, distribuite maggiormente nel macroclima temperato ma presenti anche in quello mediterraneo, su suoli da minerali a più o meno ricchi in sostanza organica. La classe comprende sia praterie fortemente concimate che magre.

Definizione e descrizione inglese

Hygrophilous, meso-hygrophilous or mesophilous meadows that occur from the coastal to montane and high-montane areas, mainly distributed in the Temperate macrobioclimate, and to a lesser extent in the Mediterranean macrobioclimate. These communities grow on mineral to more or less rich in organic matter soils. The *syntaxon* includes strongly manured to un-manured meadows.