

70.1 Ord. QUERCETALIA ILICIS Br.-Bl. ex Molinier 1934

Sinonimi

[*Quercetalia ilicis* Br.-Bl. 1931 *nom. nud.* (art. 2b, 8), *Quercetalia ilicis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 *em.* Rivas- Martínez 1975 (art. 47)]

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)

Definizione e descrizione (declaratoria)

Vegetazione forestale a dominanza di *Quercus ilex*, *Q. suber* e di caducifoglie, che si sviluppa nei settori mediterranei più freschi (termotipo mesomediterraneo), dove costituisce la vegetazione climatofila. Si rinviene anche nella variante submediterranea del macrobioclina temperato, prevalentemente nelle aree a termotipo mesotemperato, dove rappresenta la serie edafoxerofila.

Definizione e descrizione inglese

Forests dominated by *Quercus ilex*, *Q. suber* and deciduous species. They represent the climatophilous vegetation in the coolest sectors of the Mediterranean macrobioclimate (meso-Mediterranean), but can also be found in the the sub-Mediterranean variant of the temperate macrobioclimate, usually associated with the mesotemperate thermotype, where they represent the edaphoxerophilous vegetation series.