

70.2 Ord. PISTACIO LENTISCI-RHAMNETALIA ALATERNI Rivas-Martínez 1975

Sinonimi

[*Quercetalia ilicis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 p.p. (syntax. syn.), *Quercetalia calliprini* Zohary 1955, *Rhamno-Prunetalia* Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964 p.p. [*Xero-Prunetalia* Rivas Goday & Borja 1961 *nom. nud.* (art. 2b, 8)], *Tetraclinido-Arganietalia* Rivas Goday ex F. Casas & M.E. Sánchez 1972 (art. 2b, 3f), *Tetraclinido-Arganietalia* Rivas Goday ex Esteve 1973 (art. 2b, 3f)]

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)

Definizione e descrizione (declaratoria)

Vegetazione di macchia costituita da sclerofille mediterranee. Si tratta di vegetazione climatofila nelle aree a termotipo termomediterraneo e che costituisce stadi di sostituzione della vegetazione dell'ordine *Quercetalia ilicis* nelle aree a termotipo mesomediterraneo.

Definizione e descrizione inglese

Maquis vegetation consisting of sclerophyllous Mediterranean species. It mostly occurs in the thermo-Mediterranean thermotype, where it represents the climatophilous vegetation, whereas in the meso-Mediterranean thermotype this vegetation represents the serial substitution communities of vegetation belonging to *Quercetalia ilicis* order.