

71 CI QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAЕ Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937

Sinonimi

[*Querco-Fagetales* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 (original name, art. 41b), *Quercetea robori-sessiliflorae* Br.- Bl. & Tüxen 1943 (art. 8), *Quercetea robori-sessiliflorae* Br.-Bl. & Tüxen ex Br.- Bl. 1950 (syntax. syn.), *Quercetea pubescentis* Doing 1955 (art. 8), *Quercetea robori-petraeae* Br.-Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957 (art. 31), *Quercetea pubescentis* Doing ex Scamoni & Passarge 1959 (syntax. syn.), *Quercetea pubescenti-petraeae* Jakucs 1960 (syntax. syn.), *Carpino-Fagetea* Jakucs 1967 (syntax. syn.), *Fraxino-Fagetea* Moor 1975 (syntax. syn.)]

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)

Definizione e descrizione (declaratoria)

Vegetazione forestale mesofila e termofila tipica delle zone a macrobioclimate temperato, dei piani bioclimatici a termotipo mesotemperato e supratemperato, che si estende anche alle zone a macrobioclimate mediterraneo.

Definizione e descrizione inglese

Mesophilous and thermophilous forest vegetation typical of the Temperate macrobioclimate that grows in the mesotemperate and supratemperate thermotypes, occasionally extending as far as the Mediterranean macrobioclimate.